

BUGANVILLA, VERANERA

Arbustos trepador o rastrero. Presenta troncos con cortezas cuarteadas y leñosas de color marrón claro y con espinas e las ramas. Presenta flores de diferentes colores con formas estrelladas.

Nombre Científico: *Buganvillea glabra*

Origen: Brasil



Luz: Requieren buena intensidad de luz solar. Se desarrollan mucho mejor en el exterior de las casas, a pleno sol todo el año, pero evitando exposiciones prolongadas, especialmente después del trasplante. Permite el cultivo en interior sólo cuando la luz es muy intensa, junto a una ventana, pero su floración es reducida.



Agua: Se recomienda regar abundantemente cuando el sustrato este totalmente seco. No hay que pulverizar agua sobre sus hojas y se deben evitar ambientes muy húmedos, ya que estos provocan el aumento del tamaño de la hoja y disminuye su floración.



Abono: Se puede aplicar abono foliar y humus líquido cada 20 días y cada 2 meses suministrar de calidad abonos ricos en fósforo y potasio.



Trasplante: Cada 2 o 3 años, podando solo las raíces gruesas y dejando las finas. Eliminar raíces podridas. RECUERDA, el sustrato es la clave del éxito para el desarrollo de un bonsái sano, utiliza sustratos de calidad cuando realices el trasplante.



Poda: Lo más adecuado es podar después de su floración. Eliminar todos los brotes de la base del tronco y las ramas que crucen.



Cuidado con: La colocación de ramas mediante el alambrado es complicada porque sus ramas se lignifican con rapidez, volviéndose poco flexibles y quebradizas, por lo que el modelado de la buganvilla es mejor realizarlo mediante una planificación de podas en años sucesivos.



¿Sabías qué? Las flores de esta especie tienen algunas propiedades medicinales y en algunos países de América del Sur son utilizadas como infusión para frenar la tos y aliviar las enfermedades pulmonares.